

La Rosalie des Alpes

Rosalia alpina

Description Localisation	<p>Statut Espèce prioritaire visée par la Directive Habitats (An. 2 et 4) et protégée au niveau national</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <p>La Rosalie des Alpes est un coléoptère aux longues antennes bleues et au corps brun-gris ponctué de tâches noires, mesurant entre 14 et 38 mm.</p> <p>En France, l'espèce est présente surtout dans les Alpes, le massif central. Les populations de plaine sont principalement observées dans l'Ouest de la France et en Corse. Ailleurs en Europe, elle est bien présente les pays méditerranéens (Italie du sud et Grèce) ainsi que dans les forêts d'Europe centrale.</p> </div>
Biologie et habitats fréquentés	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> La Rosalie des Alpes est inféodée aux arbres sénescents ou morts, d'essences variées (frêne notamment). Les adultes ont une activité diurne et sont généralement observés sur des troncs et des souches. <input type="checkbox"/> La durée du cycle de développement de cette espèce est de 2 à 3 ans. Les œufs sont déposés dans les anfractuosités des arbres. Les larves saproxylophages se développent localement essentiellement dans les frênes. Les adultes ne sont visibles que pendant une courte période dans l'année : l'émergence intervient, en marais de Rochefort, de début juin à fin juillet.
Facteurs défavorables / Problématiques de gestion	<ul style="list-style-type: none"> - Elimination des arbres morts et des vieux arbres têtards - Fragmentation et disparition des haies, ripisylves et boisements humides - Rotation d'entretien ou de coupe trop rapide - Usage excessif d'insecticides

Orientations de gestion favorables à cette espèce

- Préserver les vieux arbres et conserver du bois mort au sol lors des opérations d'entretien
- Maintenir, restaurer et planter des haies et des ripisylves (frêne de préférence)
- Laisser des bouquets d'arbres vieillir
- Favoriser le traitement en têtard plutôt qu'en taillis